



# NYHETSREV nr. 1 – 2010

Unilabs Røntgen Tønsberg



## Bruk av intravenøse kontrastmidler

Pasienter med redusert nyrefunksjon kan få komplikasjoner etter bruk av intravenøse røntgenkontrastmidler. Vi ber deg derfor være oppmerksom på følgende:

**Har pasienten en eller flere av følgende risikofaktorer for kontrastindusert nyreskade skal kreatinin eller e-GFR verdi foreligge før undersøkelse med i.v. kontrast:**

- Alder over 70 år
- Diabetes
- Hjertesvikt
- Nyresykdom

**I tillegg gjelder følgende ved bruk av jodholdige kontrastmidler. (Kontrastundersøkelser ved røntgen og CT):**

Har pasienten e-GFR under 60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> skal metforminpreparater og ikke-steroid anti-inflammatoriske midler (NSAIDs) seponeres 48 timer før undersøkelsen. Kreatinin verdi/e-GFR verdi skal ikke være eldre enn 12 uker.

Pasienter som bruker Metformin-preparat (Glucophage, Metformin o.a.) som er undersøkt hos oss får følgende beskjed:

Metformin preparatet skal seponeres i 2 dager etter undersøkelsen og deretter skal pasienten kontrollere kreatinin/GFR hos egen lege. Bruken av Metformin kan gjenopptas hvis normal kreatinin/GFR ved denne kontrollen.

## Mammografi

Alle mammografipasienter må henvises til Bryst Diagnostisk Senter, SiV - Tønsberg, også menn.

Med vennlig hilsen  
Unilabs Røntgen Tønsberg